





想收穫**倍增**? 就從**加倍生**開始!

新世紀植物生長促進劑，不論育苗、生長、開花、結果，全程看顧，是幫助您作物收穫豐收的最佳利器。



《劃時代的生技結晶》

加倍生[®]

一、主要成份 (天然素材發酵代謝產物)

含多種活化植物要素，胺基酸 (Amino acid)
多醣體 (Polysaccharide)
以及微量元素 (Trace elements)

二、作用機制

1. 均衡作物體新陳代謝
2. 促進植物體內蛋白質合成
3. 促進葉綠素形成，提升光合作用
4. 刺激作物碳水化合物有效轉換成醣類

三、使用範圍與方法

主要功效	使用時機	使用目的	處理方式 (間隔7-10天)
強健幼苗	種子期 幼苗期	促進種子發芽 提高幼苗抗病力	600倍，浸種24-36小時 2000倍，葉面噴灑
促進開花	花芽分化期	促進花芽分化 強化花器 有效提高授粉率	2000倍，葉面噴灑
防止落果	幼果形成期	活化組織 降低生理落果 防止畸形果	2000倍，葉面噴灑
提高產量	果實肥大期	加速新陳代謝 促進蛋白質與醣類合成	2000倍，葉面噴灑
提升品質	葉部吸收期	促進葉綠素合成 提升光合作用 提高甜度	2000倍，葉面噴灑
延遲老化	生長期	均衡各部位營養狀態 抑制徒長 防止/延遲植株老化	2000倍，葉面噴灑

四、儲藏方式

放置乾燥陰涼通風處，易受潮，使用後必須密封袋口。

五、注意事項

1. 可與大部分的殺蟲劑、殺菌劑與肥料混合使用。
2. 本產品為生長促進劑，搭配肥料或營養劑，可達最佳效果。



加倍生實驗報告

草莓 試驗地區：苗栗大湖



使用加倍生的試驗組，結果與開花數量明顯增加。



未使用加倍生的對照組，結果與開花數量明顯較少。

敏豆 試驗地區：台南麻豆



使用加倍生2000倍試驗組，生長速度與枝葉發展明顯較強健。



未使用加倍生的對照組，生長速度較緩慢，枝葉亦明顯較差。

棗子 試驗地區：苗栗大湖



使用加倍生的試驗組，結果數量較多。



未使用加倍生的對照組，結果數量較少。

種子發芽測試



使用加倍生的試驗組，種子發芽成長速度較快速。



未使用加倍生的對照組，生長速度明顯較緩慢。

高麗菜



使用加倍生的試驗組，植株發育較快。



未使用加倍生的對照組，成長發育速度明顯較緩。

蕃茄



右側使用加倍生的試驗組，比左側未使用區，果柄較粗。



右側使用加倍生的試驗組比左側未使用區，果形更大、蒂頭較深。

胡瓜



使用加倍生的右側試驗組，開花數較左側的未使用區增加許多。

青蔥



右側使用加倍生的試驗組，較左側的未使用對照組，其側根發展旺盛分株較多。

這一次，要讓您輕鬆省事、收穫**倍**增！

全新上市的加倍生，增強作物的生長、開花、結果，全方位的作物祿母

讓您以最少的功夫，增加最大的產量，不論蔬果或作物，就讓加倍生助您一倍之力吧！



天然素材發酵菁華！



惠光化學股份有限公司

721 台南縣麻豆鎮苓子林17-10號 電話：06-570-2181 傳真：06-570-0065
www.huikwang.com HKC@huikwang.com

